



VYNYTY[®]

Grapholita Press

Contém **8X1 Bolsas**

Suspensão de Cápsulas (CS) com 100 g/Kg (10% p/p) de acetato de (E/Z)-8-dodecen-1-ilo + (Z)-8-dodecen-1-ol

Feromona utilizada para confusão sexual contra a traça-oriental-do-pessegueiro (*Grapholita molesta*) em pessegueiro, nectarina e damasqueiro

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANter FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de Venda N.º 1936 concedida pela DGA/V Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

Este produto pode ser utilizado em Modo de Produção Biológico

Titular da Autorização de Venda:
M2i BioControl S.A.S.
1 Rue Royale
112 Bureaux de la Colline
92210 Saint-Cloud Cedex
FRANÇA
<https://m2i-lifesciences.com>



Distribuído por:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 21 417 21 21
<https://cropsscience.bayer.pt>

VYNYTY[®] Grapholita Press é uma feromona sexual de síntese. Específica para a traça-oriental-do-pessegueiro (*Grapholita molesta*). Utilizada como método de confusão sexual. A feromona é libertada pelos pontos de difusão, impregnando o ambiente e dificultando a localização das fêmeas pelos machos, não possibilitando a sua reprodução.

UTILIZAÇÕES, DENSIDADE E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

VYNYTY[®] Grapholita Press pode ser aplicado em culturas de pessegueiro, nectarina e damasqueiro (= aperceiro, alpercheiro). **Aplicar 1,25 Kg/ha de VYNYTY[®] Grapholita Press sob a forma de 500 pontos de difusão** (aprox. 2,5 g/ponto) distribuídos uniformemente na parcela (ou seja, cerca de 1 ponto por 20 m²), idealmente em quinconce (distribuição escalonada). Reforçar sempre as bordaduras da parcela tratada.

VYNYTY[®] Grapholita Press deve ser aplicado um pouco antes do início do voo da 1.ª geração da traça-oriental-do-pessegueiro, de acordo com as capturas nas armadilhas de monitorização e/ou a informação dos avisos agrícolas da região. **Efetuar máximo de 1 aplicação por ano.** Uma única aplicação cobre todo o ciclo cultural. **VYNYTY[®] Grapholita Press** deve ser utilizado em áreas homogêneas com mínimo de 2 hectares.

Não se deve aplicar o produto durante as horas mais quentes do dia. Aplicar com tempo seco. Não aplicar o produto, se houver previsão de chuva nas 24 horas seguintes à aplicação. Evitar o tratamento foliar nas 3h seguintes à aplicação.

Intervalo de Segurança: não aplicável.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

O método de confusão sexual com **VYNYTY[®] Grapholita Press** deve ser incluído num programa de Produção Integrada, em que se deve efetuar um bom acompanhamento/monitorização da parcela a fim de detetar subidas dos níveis populacionais da praga que requerem o recurso a um tratamento inseticida. Deve-se proceder à monitorização da população de traça, com recurso às armadilhas de monitorização com feromona sexual e à observação dos frutos. Quando necessário (ataques nos frutos e/ou aumentos populacionais, ultrapassado o Nível Económico de Ataque), poderá ter que se recorrer a tratamentos fitossanitários com inseticidas autorizados. Este tratamento inseticida deve ser realizado no pico do voo da praga. No 1.º ano de utilização do **VYNYTY[®] Grapholita Press**, é recomendado efetuar o tratamento com inseticida ao pico de voo da praga. Consultar o consultor agrícola para decidir sobre o posicionamento e a quantidade de eventuais tratamentos complementares.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

[UFI: 0R7K-176C-1V1A-GPP9]

Pode provocar uma reação alérgica cutânea. • Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros. • Evitar respirar vapores. • Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. • Evitar a libertação para o ambiente. • Usar luvas de proteção. • EM CASO DE ERUPÇÃO ou IRRITAÇÃO CUTÂNEA: Consulte um médico. • Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar • Recolher o produto derramado. • Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Ficha de segurança fornecida a pedido. • **Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250** • Não armazenar a temperaturas superiores a 30 °C. • O aplicador deverá usar luvas durante o manuseamento do produto. • Após o tratamento, lavar cuidadosamente as luvas, tendo especial cuidado em lavá-las por dentro. • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. • Armazenar a temperaturas superiores a 0 °C.

Ed. 20723



ATENÇÃO

Data de validade = 12 meses após a data de produção

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.



Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

MODO DE APLICAÇÃO

VYNYTY[®] Grapholita Press é uma formulação pronta a usar. Sua formulação na forma de gel de suspensão em cápsulas é aplicada manualmente por meio de um dispositivo (**VYNYTY[®] Phero Pump**). Este dispositivo de ar comprimido permite a aplicação do produto. A bolsa de **VYNYTY[®] Grapholita Press** deve ser colocada dentro deste dispositivo (tubo plástico com bico de gatilho), para depositar os pontos de difusão do produto. Os pontos de difusão devem ser aplicados em material inerte, diretamente sobre a casca das árvores (favorecer as interseções entre os ramos e o tronco) ou sobre qualquer suporte no interior do pomar (por exemplo, postes) à altura do terço superior das árvores.

Assegurar que o diâmetro da madeira é suficientemente grande para aplicar o ponto de difusão. Não aplicar sobre folhas e/ou frutos. Favorecer a aplicação do lado norte para evitar a incidência direta do sol.

É proibida a reprodução total ou parcial deste rótulo. Respeite as utilizações, doses, condições e precauções indicadas na embalagem, determinadas através de ensaios e testes rigorosos. No entanto, note-se que não é possível ter em conta todas as variáveis e eliminar todos os riscos associados à sua utilização. O fabricante garante a qualidade do produto vendido na sua embalagem de origem e armazenado de acordo com as condições recomendadas, bem como o cumprimento do Título de AV emitido pelas autoridades locais competentes. Em nenhuma hipótese, o fabricante será responsabilizado por qualquer dano (físico ou material, direto ou indireto) decorrente da utilização do produto em violação total ou parcial das instruções contidas neste rótulo. Qualquer renúncia a esta garantia só será válida somente se emitida por escrito por um representante legalmente autorizado do fabricante.

Bayer



PT90423007A