



VYNYTY[®]

Tuta Press

Contém **8x1 bolsas**

Produto difusor de Vapor (VP) com 31 g/Kg (3,1% p/p) Acetato de (E, Z, Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-ilo + acetato de (E, Z)-3,8-tetradecadien-1-ilo
Feromona de síntese utilizada no método de confusão sexual em estufas, para controlo da traça-do-tomateiro (*Tuta absoluta*) em tomateiro, pimenteiro e beringela

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de Venda N.º 1979 concedida pela DGVAV
Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

Este produto pode ser usado em
Modo de Produção Biológico

Titular da
Autorização de Venda:
M2i BioControl S.A.S.
1 Rue Royale
112 Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex
FRANÇA
<https://m2i-lifesciences.com>



Distribuído por:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 21 417 21 21
<https://cropsscience.bayer.pt>

Produto difusor de vapor, pertencente à família SCLP. O seu modo de ação é por difusão da feromona sexual da fêmea de traça-do-tomateiro, impregnando o ambiente e dificultando a localização das fêmeas pelos machos, impedindo assim a sua reprodução.

UTILIZAÇÕES, DENSIDADE E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

VYNYTY[®] Tuta Press pode ser utilizado em todas as culturas de estufa de tomateiro, pimenteiro e beringela. **Aplicar entre 1,0-1,5 Kg/ha de VYNYTY[®] Tuta Press** (≈ 4-6 bolsas/ha), adaptando a dose de acordo com as condições meteorológicas locais e de pressão da praga. **Aplicar 750 pontos**, distribuídos homogeneamente na estufa (ou seja, cerca de 1 ponto por 15 m²), adaptando o tamanho do ponto de difusão de acordo com o número de bolsas utilizadas.

Aplicar os pontos de difusão, desde a plantação e mantendo-os até à colheita, geralmente no início da curva de voo (1.ª capturas em armadilhas de monitorização).

O intervalo mínimo entre as aplicações é de 90 dias (3 meses), consoante as condições meteorológicas de temperatura e o nível populacional da praga, de modo a não interromper a proteção durante o período de risco. Este intervalo pode durar até ao máximo de 120 dias (4 meses).

Efetuar um máximo de 4 aplicações anuais.

Intervalo de Segurança: não aplicável.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

O método de confusão sexual com **VYNYTY[®] Tuta Press** deve ser incluído num programa de Produção Integrada, com recurso a monitorização da praga e acompanhamento da estufa/parcela, de modo a detetar subidas dos níveis populacionais que exijam recurso a tratamentos inseticidas autorizados.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

[UFI: YW7K-17K4-NV1E-TE5V]

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. • Evitar respirar vapores. • Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. • Evitar a libertação para o ambiente. • Recolher o produto derramado. • Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Ficha de segurança fornecida a pedido. • **Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250** • Proteger do gelo. • Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. • Não armazenar a temperaturas superiores a 30 °C. • Arejar bem as estufas tratadas, antes de nelas voltar a entrar. • Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar botas, calças, camisa de mangas compridas, luvas e meias. • O aplicador deverá usar luvas e vestuário de proteção durante o manuseamento e aplicação do produto. • Após o tratamento, lavar bem o material de proteção, tendo especial cuidado em lavar as luvas por dentro. • O produto pode ser armazenado durante 12 meses, à temperatura ambiente. • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Ed. 20723



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.



É proibida a reprodução total ou parcial deste rótulo. Respeite os usos, doses, condições e precauções mencionados na embalagem, pois estes foram determinados através de rigorosos testes e ensaios. No entanto, note que não é possível levar em conta todas as variáveis e eliminar todos os riscos associados ao seu uso. O fabricante garante a qualidade do produto vendido em sua embalagem original e armazenado de acordo com as condições recomendadas, bem como o cumprimento do Título de AV emitido pelas autoridades competentes. Em nenhuma hipótese, o fabricante será responsabilizado por qualquer dano seja físico ou material, direto ou indireto, decorrente do uso do produto em desacordo total ou parcial com as instruções contidas neste rótulo. Qualquer renúncia a esta garantia será válida somente se emitida por escrito por um representante legalmente autorizado do fabricante.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Produto *ready-to-use* (pronto a usar). É apresentado em bolsas de alumínio com 250 g de formulação em gel de feromona microencapsulada. Cada bolsa possui uma tampa de plástico equipada com um bico e um gatilho. O produto é aplicado com ajuda do dispositivo **VYNYTY[®] Phero Pump**. O **VYNYTY[®] Phero Pump** é um aplicador manual reutilizável que usa ar comprimido para depositar os pontos de gel.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar o produto na forma de pontos de difusão entre os 1,5-2,0 metros de altura da base da planta, com recurso ao **VYNYTY[®] Phero Pump** em materiais inertes da estufa (cartolinas, correntes, postes, etc...) e não diretamente na cultura. Uma pressão curta fornece uma dose "padrão" do tamanho de uma avelã. Os pontos difusores devem ser distribuídos em filas alternadas, de forma homogênea e garantindo-se a mesma quantidade em cada um. Devem reforçar-se as bordaduras, especialmente se as laterais da estufa forem abertas e/ou não estiverem bem isoladas. Quando a instalação dos pontos de difusão estiver concluída, pressionar a válvula sob a base do **VYNYTY[®] Phero Pump** para libertar a pressão e, em seguida, desaparafusar o anel e remover a saqueta do produto. Utilizar em estufas com área mínima de 200 m².

Bayer

PT90076722B



5160378211319901

