



# VYNYTY®

## Lobesia Press

**250 g** Contenido neto

COMPOSICIÓN:  
(E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl  
acetato (10% p/p)

**CONFUSIÓN SEXUAL**  
contra la polilla del racimo  
(*Lobesia botrana*) en vid.  
Solución de Biocontrol

Suspensión de cápsulas (CS)



Antes de utilizar el producto,  
léase detenidamente la etiqueta.  
Uso profesional agrario.

Apto para Agricultura Ecológica  
según Reglamento (UE) 2021/1165

Inscrito y fabricado por:  
**M2i Biocontrol S.A.S.**  
1 Rue Royale, 112 Bureaux de la Colline  
92213 Saint-Cloud Cedex  
Francia

Distribuido por:  
**Bayer CropScience, S.L.**  
Av. Baix Llobregat, 3-5  
08970 Sant Joan Despi  
Barcelona  
Tel. 93 228 40 00

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y  
Material Fitosanitario con el número: **ES-01542**

[www.cropscience.bayer.es](http://www.cropscience.bayer.es)

### Atención



UFI:  
538K-17XX  
8V1F-4NQP

Provoca irritación cutánea. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Evitar respirar los vapores. Lavarse conscientemente tras la manipulación. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua y jabón. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. **EN CASO DE ACCIDENTE O**

**MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA:** Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta. **A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

### INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento 547/2011)

**Medidas básicas de actuación:** Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Dermatitis de contacto y sensibilización. Confusión, cefalea, náuseas y vómitos. Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua y jabón sin frotar. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

### Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario

Tratamiento sintomático y de soporte.

### Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador, trabajador y demás personas expuestas: Durante la colocación y manejo de los dispositivos, se deberá utilizar: guantes de protección química, ropa de trabajo adecuada o C1 y calzado cerrado.

### Mitigación de riesgos medioambientales

Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

### Eliminación del producto

**NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE** (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

ES90423511A

**Vynity® Lobesia Press. Composición:** (E,Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetato (10% p/p). **Distribuido por:** Bayer CropScience, S.L. Avda. Baix Llobregat, 3-5, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Tel. 932 284 000.

Vynity® Lobesia Press evita que los insectos macho localicen a las hembras, evitando el apareamiento y controlando la población de la plaga.

#### Usos y dosis autorizados

Uso	Agente	Dosis	Método de aplicación
Vid	Polilla del racimo <i>Lobesia botrana</i>	1,25 kg/ha (corresponden aproximadamente a 500 puntos de difusión)	Producto listo para usar. No diluir en agua. Aplicar al inicio del primer vuelo


**Sistema de cultivo:** Aire libre. **Número de aplicaciones por año:** 1.

Vynity® Lobesia Press es una feromona en forma de gel que se aplica con un aplicador adaptado reutilizable (Vynity® Phero Pump) que usa aire comprimido (máx. 6 bares) para administrar depósitos de gel (o "puntos de difusión").


**Instrucciones de uso:** Dosis: Aplique 500 puntos por hectárea (aprox. 1 punto por cada 20m<sup>2</sup>), lo que corresponde a 1,25 kg de producto por hectárea. Distribuir los puntos de difusión homogéneamente en la parcela. Es preferible una distribución escalonada, pero también es posible la aplicación en línea recta.

**Periodo de aplicación:** Aplicar un poco antes o al inicio del vuelo de *Lobesia botrana* de acuerdo con la información de capturas en trampas de monitoreo o bien según las recomendaciones de avisos locales. Máximo 1 aplicación al año. Una sola aplicación cubre todo el periodo vegetativo. No aplicar el producto si se prevén lluvias en las 24 h siguientes a la aplicación. Evitar el tratamiento foliar 3 h después de la aplicación.

Distribución  
escalonada



Distribución  
en línea recta



**Superficie mínima:** 2 hectáreas. Para menores, consulte a su asesor agrícola.

**Recomendaciones de aplicación:** Los puntos pueden aplicarse directamente sobre la cepa o sobre soportes en el cultivo (como postes o estacas), a la altura de los racimos. Aplicar preferiblemente sobre superficies horizontales. Si se aplica sobre la cepa, priorizar la aplicación sobre el tallo de las ramas cortadas o sobre la intersección del tronco con los brazos principales. No aplicar sobre ramas o hojas. Favorecer la aplicación en el lado Norte para evitar la exposición directa al sol. Reforzar siempre los bordes de la parcela tratada.

**Precauciones de uso:** Deben colocarse trampas de monitoreo dentro y fuera de la parcela tratada y revisarse semanalmente para controlar las poblaciones de plagas. Vynity® Lobesia Press forma parte de un programa de Gestión Integrada de Plagas y puede complementarse con tratamientos adicionales durante la temporada en caso de alta presión de plagas. Se recomienda evaluar los daños en los racimos para determinar la necesidad de tratamientos complementarios. Consulte a su asesor agrícola para decidir la cantidad y la posición de los posibles tratamientos complementarios. **Plazos de Seguridad:** No procede. **Mezclas:** No mezclar. Aplicar solo Vynity® Lobesia Press. **Compatibilidad:** Vynity® Lobesia Press es compatible con las actividades habituales de gestión del cultivo realizadas durante la temporada.


**Almacenamiento:** Almacenar en su envase original en lugar seco, bien ventilado y protegido de la luz solar entre 0 y 30 °C y un máximo de 2 años. Proteger de las heladas.

#### Gestión de envases

No reutilizar el envase. Durante su uso, vaciar completamente la bolsa de aluminio utilizando el dispositivo de presión de aplicación. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema colectivo de responsabilidad ampliada SIGFITO.



**Nota:** Está prohibida la reproducción total o parcial de esta etiqueta. Respete los usos, dosis, condiciones y precauciones mencionados en el envase, estos han sido determinados mediante pruebas y ensayos rigurosos. Sin embargo, tenga en cuenta que no es posible tener en cuenta todas las variables y eliminar todos los riesgos asociados a su uso. El fabricante garantiza la calidad del producto vendido en su envase original y almacenado de acuerdo con las condiciones recomendadas, así como su conformidad con la Autorización de Comercialización expedida por las autoridades locales competentes. En ningún caso el fabricante será responsable de cualquier daño, físico o material, directo o indirecto, derivado de la utilización del producto incumpliendo total o parcialmente las instrucciones de esta etiqueta. Cualquier renuncia a esta garantía solo será válida si es emitida por escrito por un representante legalmente autorizado del fabricante.



**Bayer**

Lote y fecha de  
fabricación:  
Ver marcado  
impreso.

ES90423538A