

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
Před použitím si přečtěte příložený návod k použití

Zato® 50 WG

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně révy vinné, jabloně, peckovin, angreštu, rybízu, jahodníku, různých druhů zeleniny, okrasných rostlin a ovocných, okrasných školek proti houbovým chorobám.

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Název a množství účinné látky: trifloxystrobin 500 g/kg (50 % hmot.)



Varování

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P260 Nevdechujte prach.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/ kojení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod /Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
OP II. st. Přípravek **je vyloučen** z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod (kromě aplikace do ovocných a okrasných školek).

První pomoc: viz příložený návod k použití

Držitel povolení:	Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, D-51373 Leverkusen, Německo
Právní zástupce v ČR/dodavatel/osoba odpovědná za konečné balení a označení:	BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5; tel.: 266 101 111

® je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer

Evidenční číslo:	4403-3
UFI:	VF60-40HT-M004-FGS7
Číslo šarže:	uvedeno na obalu
Datum výroby formulace:	uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:	2 roky od data výroby při správném způsobu skladování v originálních neporušených obalech (teplota skladování +5 až +30 °C)
Množství přípravku v obalu:	papírová krabice s Al vrstvou 150 g; 1 kg

Způsob působení

Zato 50 WG je fungicid ze skupiny strobilurinů (QoI). Biochemický způsob účinku spočívá v blokování transferu elektronů v mitochondriích buněk patogenů.

Působí tzv. mesosystemickým účinkem charakterizovaným slučivostí účinné látky trifloxystrobin s voskovými vrstvičkami na povrchu rostlin. Vlivem pohybu par dochází k dalšímu rozptýlení a ukládání přípravku na rostlinném povrchu. Malé biologicky aktivní množství trifloxystrobinu proniká dovnitř rostlinných tkání a působí translaminárně. Cévní soustavou rostlin se šíří velmi málo nebo vůbec. Trifloxystrobin zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia hub na povrchu rostlin. Inhibuje také vývoj patogenů v povrchových vrstvách rostlinných tkání.

SKUPINA	11	FUNGICID
----------------	-----------	-----------------

Návod k použití

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka k 1) plodině 2) ŠO 3) OL
jabloň	padlí jabloňové, strupovitost jabloně	0,15 kg/ha	14	
réva vinná	padlí révové	0,125-0,15 kg/ha	35	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
jabloň, réva vinná	300-1000 l/ha postřikové kapaliny	postřik, rosení	max. 3x

Upřesnění použití

Viz dále Další údaje a upřesnění.

Další omezení

Aplikaci provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Vstup do ošetřeného pole je možný až 2. den po aplikaci.

Po ukončení práce ve skleníku/fóliovníku opusťte ošetřované prostory!

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čochy.

Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

Informace o první pomoci

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety nebo bezpečnostního listu.

Při nadýchání:	Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.
Při zasažení kůže:	Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
Při zasažení očí:	Odstraňte kontaktní čochy, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaminované kontaktní čochy nelze znovu použít a je třeba je zlikvidovat.
Při požití:	Ústa vypláchněte vodou. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařské pomoci informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem – **Telefon nepřetržitě: (+420) 224 91 92 93 nebo (+420) 224 91 54 02 (www.tis-cz.cz)**.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách +5 až +30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

Likvidace obalů a zbytků

Případné zbytky aplikační kapaliny nebo postřikové jíchý se naředí cca. 1:5 vodou a bezzbytku se vystříkají na ošetřovaném pozemku; nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod.

Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu!

Prázdné obaly se důkladně vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají oprávněné osobě k odstranění. Poté se obaly spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200-1400 °C ve druhém stupni a čištěním plyných zplodin.

Případné nepoužité zbytky přípravku se rovněž předají oprávněné osobě k odstranění a po smísení s hořlavým materiálem (např. piliny) se spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

Další údaje a upřesnění

Upřesnění použití

- **jabloň – padlí jabloňové, strupovitost jaderovin**

Aplikuje se výhradně preventivně. Aplikační interval: 7-14 dní

Při způsobu dávkování vztaženém na výšku koruny se aplikuje dávka 0,05 kg/ha/1m koruny (maximální výška koruny stromu: 3 m).

- **jabloň – skládkové choroby**

Aplikace v období po ukončení kvetení omezuje výskyt skládkových chorob, zejména hnědé kruhové hniloby (*Pezicula* spp.). Pozdní aplikace (28 dní až 14 dní před sklizní) jsou účinné proti skládkovým chorobám, zejména skládkové strupovitosti jabloně (*Venturia inaequalis*), hnědé kruhové (*Pezicula* spp.) a peniciliové (*Penicillium* spp.) hnilobě plodů.

- **réva vinná – padlí révové**

Aplikuje se výhradně preventivně. V období silného infekčního tlaku nepřekračovat aplikační interval 7-10 dní a vždy používat dávku 0,15 kg/ha. Při méně vhodných podmínkách pro šíření infekce je možné aplikovat v intervalu 10-14 dní.

Antirezistentní strategie

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Zato 50 WG nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny QoI fungicidů (např. kresoxym-methyl, pyraclostrobin, trifloxystrobin) vícekrát než 3x v průběhu vegetace. Při použití proti strupovitosti a jiným chorobám neaplikujte přípravky ze skupiny QoI fungicidů kurativně a po sobě bez přerušení ošetřením fungicidem s odlišným mechanismem působení.

Technika aplikace

Přípravek Zato 50 WG se aplikuje schválenými rosiči a postřikovači.

Při aplikaci je nutné použít dostatečné množství aplikační kapaliny, aby byla dosažena rovnoměrná pokryvnost, nesmí však dojít ke skapávání přípravku z povrchu ošetřených rostlin.

Vyšší dávky aplikační kapaliny jsou vhodné pro ošetření vyšších a hustších porostů, resp. s velkou plochou zelené hmoty.

Upozornění: ošetřovaný porost nesmí být v době aplikace vlhký v důsledku rosy nebo předchozích dešťových srážek. Během 2 hodin po aplikaci by nemělo pršet.

Nedoporučujeme aplikovat v poledne v době nejintenzivnějšího slunečního svitu a vysokých teplot. Aplikace nesmí zasáhnout sousední necílové porosty!

Příprava aplikační kapaliny

Odvážené (odměřené) množství přípravku se přidá do předmíchávacího zařízení, pokud je jím rosič vybaven nebo přímo do nádrže aplikačního zařízení naplněné do jedné čtvrtiny vodou, důkladně se míchá po dobu alespoň 5 minut a doplní se voda na stanovený objem. Přípravek se aplikuje až po

dokonalém rozpuštění všech granulí (po 5 minutách míchání ve vodě). Během přípravy aplikační kapaliny a při aplikaci je nutné zajistit účinné míchání.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků

- úplně vyprázdněte aplikační zařízení na ošetřovaném pozemku
- vyjměte všechny filtry a trysky a propláchněte je čistou vodou
- naplňte aplikační zařízení do jedné čtvrtiny nebo do ponoření agitátoru vodou (v případě použití tanku mixu s přípravky na bázi oleje lze přidat 0,5% detergent)
- promíchejte nejméně jednu minutu a propláchněte skrz pumpu, pokud má aplikační zařízení systém čištění, použijte jej
- výplachovou vodu zachyťte
- proveďte propláchnutí ještě jednou
- opláchněte aplikační zařízení z venkovní strany
- výplachovou vodu naplňte do aplikačního zařízení a vystříkejte na ošetřeném pozemku nebo jiným způsobem bezpečně zlikvidujte

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny, při aplikaci a sklizni:

Ochrana dýchacích orgánů:	není nutná
Ochrana rukou:	gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1
Ochrana očí a obličeje:	není nutná
Ochrana těla:	celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688
Dodatečná ochrana hlavy:	není nutná
Dodatečná ochrana nohou:	pracovní nebo ochranná obuv např. gumové nebo plastové holínky podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347
Společný údaj k OOPP:	Poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit. Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice a brýle pro případ poruchy zařízení. Při ruční aplikaci v sadu lze doporučit další výše neuvedené OOPP (gumová nebo plastová zástěra) jako ochranu proti promočení.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného/pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí.
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očištěte.

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus (ŠO)	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka k 1) plodině 2) ŠO 3) OL	Poznámka k 4) dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
okrasné rostliny	skvrnitosti listů, rzi, padlí	0,015 %	2	2) preventivně nebo při prvním výskytu choroby 3) pro další manipulaci a uvádění na trh	4) do počátku skanutí z povrchu listů 5) venkovní a chráněné prostory
		0,15 kg/ha	2	2) preventivně nebo při prvním výskytu choroby 3) pro další manipulaci a uvádění na trh	4) plošné použití 5) venkovní a chráněné prostory

brokolice	alternářová skvrnitost brukvovitých, plíseň zelná	0,4 kg/ha	14	1) BBCH 16-49	5) venkovní prostory
kapusta hlávková, kapusta růžičková	alternářová skvrnitost brukvovitých	0,4 kg/ha	14	1) BBCH 16-49	5) venkovní prostory
zelí	alternářová skvrnitost brukvovitých, padlí, septorióza	0,4 kg/ha	14	1) BBCH 16-49	5) venkovní prostory
mrkev	padlí miříkovitých, suchá skvrnitost listů mrkve	0,4 kg/ha	21	1) BBCH 16-49	5) venkovní prostory
květák	alternářová skvrnitost brukvovitých	0,4 kg/ha	14	1) BBCH 16-49	5) venkovní prostory
cuketa, zelenina tykvovitá (s jedlou slupkou) mimo okurka	Padlí	0,25 kg/ha	7	1) BBCH 21-89	5) venkovní prostory
zelenina tykvovitá (s nejedlou slupkou) - meloun, dýně	Padlí	0,25 kg/ha	3	1) BBCH 21-89	5) skleníky
celer bulvový	Septorióza	0,25 kg/ha	21	1) BBCH 16-49	5) venkovní prostory
petržel, pastinák	padlí miříkovitých	0,25-0,4 kg/ha	21	1) BBCH 19-49	5) venkovní prostory
rajče	černá rajčatová, hnědá skvrnitost rajčat, padlí rajčatové	0,3 kg/ha	3	1) BBCH 21-89	5) skleníky
salát	septorióza salátu, antraknóza salátu	0,3-0,4 kg/ha	7	1) BBCH 16-49	5) venkovní prostory
angrešt, rybíz	americké padlí angreštové, rez vejmutovková	0,2 kg/ha	14	1) BBCH 19-81	
jahodník	antraknóza jahodníku, padlí jahodníkové, bílá skvrnitost listů jahodníku	0,3 kg/ha	3	1) BBCH 19-89	
broskvoň (včetně nektarinky)	padlí broskvoňové, moniliová spála	0,15 kg/1 m výšky koruny/ha (max. 0,45 kg/ha)	7	1) BBCH 55-81	
meruňka, třešeň	hnědnutí listů meruňky, moniliová spála	0,15 kg/1 m výšky koruny/ha (max. 0,45 kg/ha)	7	1) BBCH 55-81	
višeň	hnědnutí listů	0,15 kg/1 m výšky koruny/ha (max. 0,45 kg/ha)	7	1) BBCH 55-81	
slivoň	červená skvrnitost, skvrnitost listů, rez slivoně, moniliová spála	0,15 kg/1 m výšky koruny/ha (max. 0,45 kg/ha)	7	1) BBCH 55-81	
ovocné školky, okrasné školky	Rzi	0,15 kg/ha (0,015 %)	--		

OL-ochranná lhůta; = nejkratší možný interval mezi poslední aplikací a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
okrasné rostliny		postřik, rosení	max. 3x	10 dnů
jahodník	500-2000 l/ha	postřik	max. 3x/rok	7-10 dnů
petržel, pastinák	200-800 l/ha	postřik	max. 2x	7-14 dnů
rajče	200-1500 l/ha	postřik	max. 3x	7-14 dnů
angrešt, rybíz	200-1000 l/ha	postřik, rosení	max. 3x/rok	7-14 dnů
třešeň, višeň, broskvoň, meruňka, slivoň	max. 500 l/1m výšky koruny (200-1500 l/ha)	postřik, rosení	max. 2x/rok	7-14 dnů
zelenina tykvovitá, cuketa	200-1200 l/ha	postřik	max. 3x	7-14 dnů

zelí, brokolice, celer, kapusta hlávková, kapusta růžičková, mrkev, salát	200-600 l/ha	postřik	max. 2x	7-14 dnů
květák	200-600 l/ha	postřik	max. 3x	7-14 dnů
ovocné školky, okrasné školky	200-1000 l/ha	postřik, rosení	max. 3x/rok	7 dnů

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Okrasné rostliny:

Druhová a odrůdová citlivost: není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na malém vzorku rostlin v daných podmínkách. Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

SPe2	Při aplikaci na tykvovitou zeleninu, cukety, petržel, pastinák, jahodník: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
-------------	---

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
brokolice, kapusta, zelí, mrkev, květák, celer, salát, tykvovitá zelenina, cuketa, petržel, pastinák, rajče, jahodník	4	4	4	4
angrešt, rybíz, ovocné stromy, ovocné a okrasné školky (rostliny nad 50 cm)	6	6	6	6

Dodatková informace společnosti Bayer:

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.

Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.

Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.